



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO

CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA

Presidente Prof. Erich Cosmi

TESI DI LAUREA:

**CONTATTO PELLE A PELLE: SOSTEGNO ALLA COMPETENZA MATERNO-
NEONATALE E RUOLO DELL'OSTETRICA**

Relatore: Dott.ssa Mussi Patrizia

LAUREANDA: MARDEGAN Alessia

ANNO ACCADEMICO 2017/2018

INTRODUZIONE

Gli approcci contemporanei all'iniziazione dell'allattamento al seno durante il contatto pelle a pelle si basano sull'esistenza di:

- innate capacità neonatali («*Breast Crawl*»)
- competenze materne («*Biological nurturing*»)

SCOPO DELLO STUDIO:

Basandosi su esperienze dirette di contatto pelle a pelle si indaga l'effettiva presenza di posizionamenti spontanei da parte della madre e del neonato e in che modo si pone la figura del professionista sanitario in questo contesto

MATERIALI E METODI

- Periodo tra Marzo e Maggio 2018
- presso l'U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale "Ca' Foncello" dell'ASSL 2 Marca trevigiana
- 90 coppie madre-neonato che dopo il parto effettuavano il contatto pelle a pelle nelle due ore successive




a 30 minuti e 120 minuti di contatto pelle a pelle

1. posizione assunta da madre e neonato
(Biological Nurturing verticale, Biological nurturing obliquo, classica o sul fianco)

2. posizionamento spontaneo o guidato dall'
ostetrica/infermiera


RISULTATI

Posizioni assunte a 30 minuti



- Posizioni assunte spontaneamente
- Posizioni guidate dall'ostetrica/infermiera

Posizioni assunte a 120 minuti



- posizioni assunte spontaneamente
- posizioni guidate dall'ostetrica/infermiera

RISULTATI



Posizionamenti spontanei a 30 minuti

BN verticale	57%
BN obliquo	43%
classica	0%
Sul fianco	0%

Posizionamenti spontanei a 120 minuti


BN verticale	29%
BN obliquo	63%
Classica	2%
Sul fianco	6%



RISULTATI


Posizionamento a 120 minuti di una posizione spontanea a 30 minuti

(Su n°47 posizioni spontanee)
nel **23%** dei casi si rileva un
intervento correttivo



Posizionamento a 120 minuti di una posizione guidata a 30 minuti


(Su n°23 posizioni guidate)
nel **61%** dei casi si tramuta in un
posizionamento **spontaneo**




CONCLUSIONI

La **posizione semi-reclinata** risulta essere il posizionamento spontaneo ottimale per tutto il periodo di contatto pelle a pelle.

Benessere psico-fisico materno



Manifestazione di **riflessi neonatali primitivi** di ricerca del seno



CONCLUSIONI

L'**operatore sanitario** durante il contatto pelle a pelle deve ricordarsi che al centro dell'assistenza ci deve essere la **diade madre-neonato** e le loro competenze innate.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

