



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO
CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA
Presidente Prof. Giovanni Battista Nardelli

ALLATTAMENTO ENTRO UN'ORA DAL PARTO E CONTATTO PELLE A PELLE: ESPERIENZA PRESSO L'OSPEDALE DI TOSAMAGANGA, TANZANIA. CUAMM PADOVA

Relatore: Prof. Giovanni B. Nardelli
Correlatore: Dott.ssa Laura Puma

LAUREANDA: STEFANIA TOVAZZI

ANNO ACCADEMICO: 2016/2017

INTRODUZIONE

“Breastfeeding is the normal way of providing young infants with the nutrients they need for healthy growth and development. Virtually all mothers can breastfeed, provided they have accurate information, and the support of their family, the health care system and.”

*-World Health Organization
(1)*

“Mettere i neonati in contatto pelle a pelle con la madre immediatamente dopo la nascita per almeno un’ora e incoraggiare le madri a comprendere quando il neonato è pronto per poppare, offrendo aiuto se necessario.”

-UNICEF(2)

(1)WHO, 2008

(2)Lau Y et al. 2017, DOI




MEDICI CON L'AFRICA CUAMM



SCOPO DELLO STUDIO




Modalità del parto



Contatto pelle
a pelle


Efficacia della poppata



Contatto pelle
a pelle

➤ *Infant BreastFeeding
Assesment Tools
(IBFAT) score:*

- Voglia di poppare
- La ricerca del capezzolo
- La capacità di attaccarsi al seno correttamente
- L'efficacia della suzione



MATERIALI E METODI




Ospedale di
Tosamaganga,
Iringa, Tanzania

195 pazienti

26 giugno 2017 – 23
luglio 2017


RISULTATI (1/2)

Istogramma raffigurante il numero di contatto pelle a pelle correlato alla tipologia di parto



	parto vaginale	parto cesareo	parto operativo
Contatto skin to skin avvenuto	79	0	0

RISULTATI (2/2)




- Contatto skin to skin non avvenuto
- Contatto skin to skin avvenuto

$p < 0,05$

	IBFAT efficace	IBFAT non efficace	Totale
Contatto skin to skin avvenuto	57	22	79
Contatto skin to skin non avvenuto	35	81	116
Totale	92	103	195

CONCLUSIONI

- La modalità del parto condiziona l'esecuzione del contatto *skin to skin*



- L'IBFAT si è rilevato statisticamente efficace nelle madri che hanno eseguito lo *skin to skin*

Grazie per l'attenzione



Stefano Raimondi